



Woman secret

Jednokrokový tyčinkový tehotenský test 1+1 ZADARMO

Určené na samodiagnostiku

„Baby“

Vybrali ste si vysokokvalitný tehotenský test
Woman secret „Baby“.

Určený účel použitia:

Tehotenský test **Woman secret „Baby“** je určený pre kvalitatívnu detekciu hormónu hCG, k rýchlemu a spoľahlivému zisteniu včasného tehotenstva. Je určený na domáce použitie - na samodiagnostiku (samotestovanie). Vysoká citlivosť testu a jeho presnosť Vám pri správnom používaní testu umožní zistiť tehotenstvo už 5-7 dní po počatí. Test je možné použiť v priebehu 24 hodín a je určený na jedno použitie.

Súhrn:

Ludský choriogonadotropín (hCG) je hormón vytváraný placentou a vyuľčovaný do moču už krátko po oplodení. Zvyčajne je možné hCG zistiť domácim tehotenským testom do 5-7 dní po počatí. Tento tehotenský tyčinkový test deteguje hCG v moči v koncentrácií 10 mIU/ml (Milli-medzinárodné jednotky) alebo vyššej. Koncentrácia hCG u netehotných žien je **normalne 88** 5,0 mIU/ml. V čase poslednej vynechanej menštruačnej súhody hladin hCG v moči približne 100 mIU/ml s maximálnymi hladinami 100 000 až 200 000 mIU/ml pozorovanými na konci prvého trimestra.

Zloženie:

Tehotenský test obsahuje anti- β hCG na koloidných časticach zlata a kombináciu anti- α hCG potiahnuté na membráne.

Testovacia súprava obsahuje:

Každé vrecko obsahuje:

1. Jednokrokový tehotenský tyčinkový test
2. Vysúšadlo (Vyhodte - Nejedzte)

Každá krabička obsahuje:

1. Dve fóliové vrecká
2. Návod na použitie

Skladovanie:

Testovaciú súpravu skladujte pri teplote (2° - 30°C) v utesnenom obale do dátumu expirácie. Testovacia súprava by mala byť chránená pred slnečným žiareniom, vlhkom a teplom.

Upozornenie:

1. Pred použitím si prečítajte dôkladne návod na použitie.
2. Testovacia súprava je určená na použitie in vitro (samodiagnostika).
3. Testovacia súprava je určená na jedno použitie. Po jednom použití ho zlikvidujte v koši na odpad.
4. Testovacia súprava by mala zostať vo fóliovom vrecku až do doby jej použitia.
5. Akonáhle ste fóliový obal otvorili, test ihneď použite. Test by mal byť vykonaný do 1 hodiny po otvorení vrecka.
6. Nepoužívajte testovaciú súpravu, ak bolo fóliové vrecko porušené, poškodené alebo otvorené po jeho vytiahnutí z krabičky.

7. Nedotýkajte sa membrány umiestenej vnútri okienok.
8. Nepoužívajte po dátume expirácie.
9. Neprehŕňajte vysúšadlo a test uchovávajte mimo dosahu deťí.

Testovanie:

1. Kedy môžem test použiť?

Na testovanie je najlepší raňajší moč, nakoľko má najvyššiu koncentráciu hCG hormónu, avšak testovanie môže byť vykonané aj kedykoľvek v priebehu dňa. Test možno použiť už 5 - 7 dní po počatí.

2. Prevedenie testu:

1. Test aplikujte pri izbovej teplote. Otvorte ochranný obal a vyberte testovaciu tyčinku. Odstráňte farebný kryt, aby ste odkrili absorbčnú časť tyčinky.
2. Tyčinku uchopte tak, aby absorbčná časť smerovala nadol. Nasmerujte absorbčnú časť tyčinky priamo do prúdu moču, až pokiaľ nie je úplne nasiaknutá (min. 10 sekúnd). Nepriepustná fólia v kontrolnom okienku zabráni priamemu styku s tekutinou.
3. Vzorku moču môžete odobrať aj do čistej nádoby a absorbčnú časť tyčinky ponorte do odobratej vzorky na 10 sekúnd.
4. Položte testovaciu tyčinku na podložku a nasadte naspať na absorbčnú časť ochranný kryt.
5. Počkajte, pokým sa v kontrolnom okienku objavia farebné čiarky. V závislosti od koncentrácie hCG hormónu sa výsledky môžu ukázať do 40 sekúnd. Kompletný výsledok by mal byť viditeľný do 5 minút. Nikdy nezistujte výsledok testu po dlhšej dobe ako 10 minút od aplikácie vzorky moču.



Vyhodnotenie výsledku testu:

Negatívny výsledok:

Pokiaľ sa v kontrolnom okienku vedľa „C“ objaví len jedna čiarka, znamená to, že nie ste tehotná, alebo ste sa testovali príliš skoro. Ak si nie ste istá, test opakujte do 48 hodín.

Positívny výsledok:

Pokiaľ sa v kontrolnom okienku objavia dve farebné čiarky vedľa „C“ aj „T“, znamená to, že ste tehotná. hCG hormón bol detegovaný vo Vašom moči. Jedna čiarka môže byť svetlejšia ako druhá, čo však nemá žiadny vplyv na pozitívny výsledok.

Chybny výsledok:

Ak sa v kontrolnom okienku nezobrazí žiadna čiarka, alebo iba jeden farebný pás vedľa písma "T", test bol vykonaný chybne. Opakujte test s novou testovacou súpravou.



Negatívny



Pozitívny



Chybny



Chybny



Woman secret

Jednokrovový tyčinkový tehotenský test 1+1 ZADARMO „Baby“

Určené na samodiagnostiku

Charakteristika:**1. Citlivosť**

Jednokrovový tyčinkový tehotenský test ukáže pozitívne výsledky so vzorkami moču obsahujúcimi hCG na úrovni 10 mIU/ml.

2. Presnosť

Na základe klinických laboratórnych testov bola presnosť testu viac ako 99%. Výsledky testu majú informatívny charakter. Pre potvrdenie výsledkov kontaktujte svojho lekára.

Analytická citlivosť (analytical sensitivity): Nie menej ako 10mIU/ml.

Analytická špecifickosť (analytical specificity):

Výsledky testu sú negatívne u vzoriek : hLH 500mIU/ml (WHO 1st IRP), hFSH 1000 mIU/ml (WHO 1st IS); hTSH 1000pIU/ml (WHO 2nd IRP)

Krížová reakcia hCG testovacích súprav bola hodnotená s hCG homolognými hormónmi. Homológne hormóny FSH, LH a TSH boli pridané do vzoriek moču obsahujúcich hCG v koncentrácií 0 a 10 mIU/ml. V štúdii nebola pozorovaná žiadna krížová reakcia.

Testovanie interferencie:

Krížová reakcia testovacích súprav hCG bola hodnotená s nasledujúcimi látkami uvedenými nižšie v tabuľke. Nebola pozorovaná žiadna krížová reakcia.

Acetaminofén (Paracetamol)	20 mg/ml	Glukóza	20 mg/ml
Kyselina acetyl salicylová	20 mg/ml	Hemoglobín	10 mg/ml
Kyselina askorbová	20 mg/ml	Albumín	100 mg/ml
Kofein	20 mg/ml	Bilirubin	0,06 mg/ml
Atropín	20 mg/ml		

Empirický dôkaz:**Klinická štúdia:**

Klinická štúdia prebiehala na dvoch klinikách (dve štúdie). V každej štúdii bolo vykonané testovanie so vzorkami od 110 pacientiek (celkovo 220). Pre porovnanie výsledkov testovania bol použitý iný komerčný výrobok s rovnakou citlivosťou ako test, ktorý ste sa rozhodli použiť.

Na základe výsledkov testovania bolo dokázaná zhoda na 99,09%.

Obmedzenia:

Neodporúča sa použiť test po požití alkoholu. Alkohol môže ovplyvniť výsledok testu.

Vzorky moču s nízkou hladinou hCG - menej ako 10 mIU/ml, môžu časom vykazovať vytvorenie farebnej ciary. Ak vykonáte test príliš skoro, hladina hCG môže byť stále nízka, a preto môže byť výsledok negatívny. V tomto prípade by sa mala odobrat' ďalšia vzorka moču najmenej o 48 hodín neskôr a mala by sa otestovať.

Hladiny hCG môžu zostať detegovateľné niekoľko týždňov po normálnom pôrode, pôrode cisárskym rezom, spontánnom potrate alebo po asistovanom potrate.

V prípadoch, keď sú prítomné veľmi vysoké hladiny hCG (>500 000 mIU/ml), môže dôjsť k falošne negativnému výsledku v dôsledku efektu „Prozone“. Ak máte stále podozrenie na tehotenstvo, jednoducho zriďte vzorku v pomere 1:1 deionizovanou vodou a zapukajte test.

Hoci nie je nutné vykonať test s rannou vzorkou moču, je

potrebné sa pred testovaním vyhnúť nadmernému príjmu tekutín. Ak je vzorka moču príliš zriedená, nemusí obsahovať reprezentatívnu hladinu hCG a môže sa dosiahnuť výsledok testu „NEGATÍVNY“.

Ak je stále podozrenie na tehotenstvo, je potrebné odobrať prvú rannú vzorku moču a znova ju otestovať o 48 hodín neskôr. V prípade pochybností, kontaktujte svojho lekára.

Referencie:

1. Batzer FR. Hormonal evaluation of early pregnancy. Fertil. Steril. 1980;34(1):1-13
2. Catt KJ, ML Dufau, JL Vaitukaitis Appearance of hCG in pregnancy plasma following the initiation of implantation of the blastocyte, J.Clin. Endocrinol.; Metab. 1975;40(3):537-540
3. Braunstein GD, J Rasor, H.Danzer, D Adler, ME Wade Serum human chorionic gonadotropin levels throughout normal pregnancy. Am. J.Obstet. Gynecol. 1976;126(6):678-681
4. Lenton EA, LM Neal, R Sulaiman Plasma concentration of human chorionic gonadotropin from the time of implantation until the second week of pregnancy, Fertil, Steril. 1982;37(6):773-778
5. Steier JA, P B ergsjo, OL Myking Human chorionic gonadotropin in maternal plasma after spontaneous abortion and induced abortion, removed ectopic, Obstet Gynecol. 1984;64(3) 391-394
6. Dawood MY, BB Saxena, R Landesman Human chorionic gonadotropin and its subunits in hydatidiform mole and choriocarcinoma, Obstet. Gynecol. 1977;50(2):172-181
7. Braunstein GD, JL Vaitukaitis, PP Carbone, GT Ross Ectopic production.

Použité symboly:

	Pozri návod na použitie		Nepoužívať, pokiaľ je poškodený primárny obal
	Nepoužívať opakovane		Teplotné obmedzenie
	Conformité Européene (Európska zhoda)		Obsah postačuje na <n> skúšok
	Dátum spotreby		Pridelené registračné číslo ŠÚKL
	Kód šarže		Chrániť pred slnkom
	In Vitro diagnostická pomocnica - určené na samotestovanie		Uchovávať v suchu
	Výroba (meno spoločnosti, adresa)		

Výrobca a distribútor:

IMPERIAL VITAMINS, s.r.o.

Horná 13, 038 61 Vrútky

Slovensko

tel.: 043/4001082, fax: 043/4001084

e-mail: womansecret@womansecret.sk

web: www.tehotenskatesty.sk, www.imperialvitamins.sk



1023

IV81306

IVSK-TT-IFO M2/04/2022-04-07